



FICHA TÉCNICA

USO VETERINARIO

PRODUCTO	TRIPLE SULFA INYECTABLE GENEVET
PRESENTACIÓN	500 ml, 250 ml. Y 100 ml
COMPOSICIÓN x mkl	Cada 100 ml contiene: SULFAMETAZINA SODICA..... 60.67 grs SULFADIAZINA SODICA 60.67 grs SULFATIAZOL SODICO 60.67 grs ALCOHOL ETILICO 29,41 grs EXIPIENTES INERTES C.S.P.100 ml
ESPECIE	Aves, Bovinos, Bufalinos, Caninos, Caprinos, Ovinos, Porcinos y Equinos:
DOSIFICACIÓN	Equinos: 600 kg, 300 ml cada 24 h / 5 a 7 días. Bovino: 450 kg, 225 ml – 300 kg, 150 ml cada 24 h / 5 a 7 días. Porcinos: 100 kg, 50 ml cada 24 h / 5 a 7 días. Ovinos y Caprinos: 30 kg, 15 ml cada 24 h / 5 a 7 días. Caninos: 30 kg, 15 ml cada 24 h / 5 a 7 días. Felinos: 4 kg, 2 ml cada 24 h / 5 a 7 días. Aves: 5 ml por litro de agua de bebida, preparar agua medicada cada día.
ADMINISTRACIÓN	Administrar por vía intramuscular profunda, Y o Intravenosa lentamente
INDICACIONES	<i>Aves: Enfermedad respiratoria crónica asociada con E. Coli, Coriza Infecciosa, Colibacilosis, Complejo respiratorio producido por stress (vacunaciones, cambios climáticos, etc.), salmonelosis, estreptococcias, estafilococcias. Cerdos y Pequeños animales: Diarreas (Coccidiosis, E. Coli, Salmonella) Neumonías bacterianas y otras enfermedades causadas por gérmenes Gram-positivos y Gram-negativos. Bovinos: Afecciones sensibles a las sulfas en general</i>



PRECAUCIONES Y TIEMPO DE SUPRESIÓN	<p>Precauciones:</p> <p>No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente. No administrar por vías distintas a la autorizada. La administración por vía intravenosa puede producir colapso, irregularidades cardíacas, vasodilatación, parálisis respiratoria y muerte.</p> <p>Respetar la pauta posológica. No se deben administrar dosis superiores a las recomendadas.</p>
RECOMENDACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Si su médico veterinario lo recomienda, utilice una dosis mayor. • Manténgase en lugar seco y fresco. • Manténgase fuera del alcance de los niños. • Consulte a su médico veterinario.



TRIPLE SULFA

Solución Inyectable de Acción Prolongada

Indicaciones:
Medicamento de amplio espectro contra gérmenes Gram positivos y negativos como: Pasteurella sp., Salmonella sp., E. Coli, Fusobacterium sp., Shigella sp., Streptococcus sp. y Staphylococcus sp., Campylobacter sp., Corynebacterium sp. y Coccidia. Es una solución estéril de uso parenteral, útil en el tratamiento de infecciones respiratorias, digestivas, genitourinarias, del sistema nervioso central y locomotor de bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caninos y aves. Para tratar la Coccidiosis cecal e intestinal de las aves.

Especies Destino:
Caprinos, equinos, bovinos, aves, porcino, canino y felino.

Dosis:
10 ml. por cada 20 kg de peso vivo, por vía intramuscular.
1 ml. por cada 2 kg. de peso vivo, en pequeñas especies.
Aves 5 ml por Litro de agua de bebida, preparar medicada cada día a juicio del médico Veterinario.

Composición:

SULFAMETAZINA SODICA.....	6.67 gr
SULFADIAZINA SODICA	6.67 gr
SULFATIAZOL SODICO	5.67 gr
ALCOHOL ETILICO	2.941 gr
METILPARABENO.....	0.277 gr
PROPILPARABENO.....	0.020 gr
AGUA DESTILADA c.s.p.....	66.699gr
EXCIPIENTES C.S.P.....	100 m

Via de Administración:
Intravenosa, intramuscular y oral en aves.

Fabricado y Distribuido Por:
GENE-VET LABORATORIOS, C.A.
RIF J-31052139-5
VALENCIA ESTADO CARABOBO.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

REGISTRO INSAI #
VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN
MÉDICA VETERINARIA.
CONSERVESE EN LUGAR SECO
Y PROTEGIDO DE LA LUZ
MANTENER FUERA
DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS.

LOTE #
ELAB:
EXP:

Presentaciones:
10 ml, 50 ml, 250 ml y 500 ml



USO VETERINARIO

ASESOR TECNICO: M.V. Javier Suarez